

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Hasil penelitian diperoleh dari 50 subyek penelitian, dengan usia rata-rata 55.1 tahun, laki-laki sebanyak 32 orang, sedangkan perempuan sebanyak 18, dengan berat badan rata-rata responden 57.4 kg. Dari hasil pemeriksaan penunjang responden diperoleh nilai rata-rata HbA1c sebesar 8%, GDS 220 mg/dl, LED 58.2 mm/jam, leukosit 11,247.8, hasil pemeriksaan sputum BTA positif pada 17 responden, negatif pada 11 responden, hasil foto toraks sesuai pada 40 responden dan tidak sesuai pada 1 responden, serta didapatkan adanya TB ekstrapulmonal pada 2 orang responden. Sedangkan untuk tatalaksana, 17 responden mendapat terapi insulin, 38 responden mendapat terapi antidiabetik oral, dan 38 responden mendapat terapi obat antituberkulosis.
2. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 96 % responden yang membaik dan 4% responden yang meninggal.

6.2 Saran

1. Bagi peneliti, sebaiknya melihat karakteristik lain dari pasien DM tipe II dengan TB paru, seperti tanda dan gejala yang dialami atau penyakit lain yang menyertai, serta meninjau lebih lanjut kriteria diagnostik pada responden yang tidak dilakukan pemeriksaan.
2. Bagi instansi terkait, sebaiknya lebih memperhatikan karakteristik pasien DM tipe II dengan TB paru sehingga dapat mengurangi tingkat mortalitas pasien.