

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

- 6.1.1. Pada penelitian, didapatkan 118 data pasien Tuberkulosis dengan frekuensi terbanyak pada pasien berusia 31 tahun dan dominan laki-laki.
- 6.1.2. Sembilan dari 118 pasien Tuberkulosis mengalami efek samping akibat obat anti tuberkulosis selama pengobatan dengan gejala terbanyak yaitu mual muntah dan sindrom flu.
- 6.1.3. Ditemukan bahwa 115 (97,5%) dari 118 pasien Tuberkulosis mendapatkan pengobatan anti tuberkulosis dengan dosis KDT yang tepat.
- 6.1.4. Berdasarkan 118 data yang diambil, diperoleh bahwa 108 pasien Tuberkulosis mengalami perubahan berat badan dengan 106 diantaranya mengalami peningkatan berat badan.

6.2. Saran

- 6.2.1. Dilakukan pencatatan data yang lebih lanjut mengenai efek samping, faktor komorbiditas, dan riwayat penggunaan obat pasien Tuberkulosis untuk memudahkan penelitian selanjutnya.
- 6.2.2. Dilakukan pencatatan data yang lebih lanjut mengenai riwayat kebiasaan pasien Tuberkulosis.