

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

- 6.1.1. Derajat OA genu pada pasien di RS Royal Taruma Jakarta Barat yaitu sebanyak dua (2,5%) orang memiliki OA derajat 1, 24 (30%) orang memiliki OA derajat 2, 34 (42,5%) orang memiliki OA derajat 3, dan 20 (25%) orang memiliki OA derajat 4.
- 6.1.2. Derajat nyeri pada pasien OA genu di RS Royal Taruma Jakarta Barat yaitu sebanyak 56 (70%) orang mengalami nyeri derajat ringan, 21 (26,3%) orang mengalami nyeri derajat sedang, dan tiga (3,8%) orang mengalami nyeri derajat berat.
- 6.1.3. *Trend* derajat nyeri pada pasien OA genu adalah mayoritas pasien memiliki derajat nyeri ringan namun mengalami OA genu dengan derajat 3-4.

#### **6.2. Saran**

- 6.2.1. Dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode penentuan derajat nyeri yang berbeda sebagai pembandingan hasil penelitian.
- 6.2.2. Dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari hubungan antara derajat nyeri dengan derajat OA genu.
- 6.2.3. Dilakukan penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih banyak.
- 6.2.4. Dilakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh untuk mengurangi bias perancu.